

新編醫學正傳

醫學正傳卷之五目錄

○麻木門

甲論

脈法

丹溪方法一條

人參益氣湯

導氣湯

天麻黃芪湯

補氣升麻和中湯

麻黃桂枝升麻湯

神效黃芪湯

補氣湯

中和補氣湯

祖傳三妙丸

○耳病門

甲論

脈法

丹溪方法九條

東垣滋腎丸

柴胡聰耳湯

蔓荊子散

黍粘子湯

祖傳經驗方

○目病門

甲論

脈法

丹溪方法九條

滋陰地黃丸

撥雲退翳丸

羊肝丸

春雪膏

爛翳驗方

神効明目湯

明目細辛湯

復明湯

助陽和血湯

歸葵湯

救苦湯

益陰腎氣丸

當歸龍膽湯

瀉陰火丸

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

還睛紫金丹

重明散

石膏羌活散

黃連膏

滌昏膏

金絲膏

地芝丸

眼睫方

點眼光明丹

丹溪活套

祖傳固本還睛丸

經驗復明膏

○口病門 四十三 論

脉法

丹溪方法 九條

益膽湯

柴胡地骨皮湯

又丹溪方法 九十四條

鵬砂散

碧雪

祖傳經驗方

丹溪活套

○喉痺門 四十四 論

脉法

丹溪方法 九十五條

通關飲

又治喉痺方

普濟消毒飲子

桔梗湯

又治喉痺二方

吹喉散

聖煙筒

祖傳方

又祖傳方

○齒病門 早五論

脉法

丹溪方法 九十條

灸牙疼法

治虫牙痛方

走馬牙疳神方

小兒走馬牙疳方

東垣射香散

草薺寇散

羌活散

白牙散

獨聖散

立効散

牢牙散

清胃散

神功散

祖傳方

又祖傳方

擦牙止痛方

祖傳灸法

○鼻病門 早六論

脉法

丹溪方法 九條

鼻淵防風湯

麗澤通氣湯

溫肺湯

御寒湯

祖傳經驗方

又祖傳驗方

○血証門早七論

脉法

丹溪方法三七條

人參飲子

痰雜血出方

三黃補血湯

痰嗽吐血方

黃芪散

痰帶血咳出方

雞蘇散

薏苡仁散

又丹溪方法九條

犀角地黄湯

四生丸

聖餅子

宣明地榆湯

結陰丹

椿皮散

烏梅丸

槐花散

加減四物湯

當歸和血散

枳殼散

酒煮黃連丸

秘方殼湯

槐角丸

升陽去熱和血湯

升陽補胃湯

生地黄散

玉屑膏

龍骨散

豺香散

經驗瀉血方

又方治前証

桃仁承氣湯

抵當湯

丹溪活套

祖傳經驗方

髮灰丸

大便下血經驗方

已試鑿驗一併

○痔漏門單八論

脉法

丹溪方法九十二條

秦朮羌活湯

秦朮蒼朮湯

秦朮當歸湯

秦朮防風湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

七聖丸

秦朮白朮丸

脫疔方二條

祖傳七花丸

又經驗祖傳方

○汗証門單九論

脉法

丹溪方法九十四條

麥煎湯

調衛湯

當歸六黃湯

黃芪建中湯

四制白朮散

正氣湯

河間白朮散

丹溪活套

祖傳經驗方

○瘞証門 平論

脉法

丹溪方法 九三條

瓜蒌桂枝湯

葛根湯

麻黃葛根湯

大承氣湯

桂枝葛根湯

桂枝瓜蒌根湯

小續命湯

防風當歸湯

當歸補血湯

舉卿舉敗散

丹溪活套

已試鑒驗 二條

○厥証門 平論

脉法

丹溪方法 一條

活人書方法

五味子湯

桂枝麻黃各半湯

茯苓甘草湯

通脉四逆湯

當歸四逆湯

吳茱萸湯

蘇合香丸

丹溪活套

○癲狂癰門 平論

脉法

丹溪方法 九三條

龍腦安神丸

神應丹

錢氏五色丸

元戎二白丸

拔萃妙香丸

硃砂滾涎丸

碧霞丹

控涎丹

牛黃瀉心湯

牛黃清心丸

丹溪活套

祖傳秘方

○邪祟門五十三論

抹法

丹溪方法一條

素問五邪証

五邪刺法

丹溪治婦人方法

秦承祖灸鬼法

還菴丹

桃奴丸

蘇合香丸

治魘死方法

祖傳辟邪丹

已試鑒驗一條

○怔忡驚悸門五論

脉法

丹溪方法九三條

治勞役心跳方

驚悸養心湯

東垣安神丸

溫膽湯

定志丸

朱雀丸

八物定志丸

歸脾湯

祖傳經驗方

又祖傳經驗方

○三

消門

五

論

脉法

丹溪方法

九條

猪肚丸

又丹溪方法

二條

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

生津甘露飲

黃芪飲

人參白朮湯

絳雪散

人參散

六味地黃丸

大黃甘草飲子

麥門冬飲子

丹溪活套

祖傳經驗方原蚕蠶湯

新編醫學正傳卷之五

花溪恒德老人虞搏天民編集

麻木

論

內經曰風寒溫三氣合而爲痺故寒氣勝者爲痛痺溫氣勝者爲著痺河間曰留著不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛痒如繩扎縛初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是溫痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感溫麻木熱作者又有因虛而風寒

濕三氣乘之故周身掣痛蕪麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也鑿者宜各以類推而治之不可執一見也

脉法

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上体關後得之麻在下体也

脉浮而緩屬濕爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉濇而芤屬死血爲木不知痛痒

方法

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮桃仁紅花少加附子行經

○人參益氣湯治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧熱傷元氣也

黃芪 二錢

炙甘草

升麻

各半錢

五味子 三十粒

柴胡 六分

生甘草

人參

各一錢二分

白芍藥 七分

右細切作一服水二盞去粗稍熱服

○導氣湯治兩腿麻木沉重

黃芪 二錢

甘草 一錢半

青皮 一錢

升麻

柴胡

當歸稍

澤瀉

各半錢

陳皮

紅花 少許

五味子

三十粒

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○天麻黃芪湯治表有風証因連日醉飲其証復來右口角併

眼牽引側視及左手腳腿麻木疼痛

天麻

芍藥

神麴

炒

羌活

如文即不用

茯苓

各三分

人參

黃連

各四分

川歸

各五分

黃芪

甘草

升麻

葛根

黃柏

蒼朮

各六分

澤瀉七分

柴胡

九分

或加猪苓六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

東垣

○補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦洪緩相合

按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其診閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開目則此証不作是以不敢合眼致不得卧身體皆重時有痰嗽覺胃中不利煩燥氣短喘促肌膚亢盛飲食不減大小便如常此非風邪乃氣不行也治宜補益肺氣自愈如經脉中陰火乘其陽分火動爲麻木者當蕪去其陰火則安矣

生甘草

去腎熱 黃柏 酒炒除

白茯苓

除濕 澤瀉 除濕

升麻

行濕助 柴胡 已上各

蒼朮

除濕

草薢

去風

陳皮

歸身

白朮

各四

白芍藥

人參

各六

佛耳草

炙甘草

各八

黃芪 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○麻黃桂枝升麻湯治婦人先患渾身麻木睡覺則小減開目

則已其証愈後又因心中煩惱遍身骨節疼痛身體沉重飲食減少腹中氣不轉運

木香

生薑 各二

桂枝

半夏

陳皮

草薢

厚朴

制

黑附子

炮去

黃柏

各三

炙甘草

升麻

白朮

茯苓

澤瀉 各四

黃芪

麻黃

不去節

人參各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○神効黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面手足附背腿脚麻木並皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視物昏花睛痛亦皆治之

黃荊子二分 陳皮半錢

人參八分

炙甘草

白芍藥一錢 黃芪二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黃柏只加黃芪一錢通三錢如麻木甚者加芍藥一錢通二錢如水便淋澁加澤瀉五分一服去則止如有大熱証加酒洗黃柏三分

○補氣湯治皮膚麻木神効

黃芪

陳皮

甘草

各一錢

澤瀉

六分

芍藥

八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○冲和補氣湯治令眼則麻木開則不麻四肢無力痿厥醋心

目昏頭眩神効

羌活

七分

獨活

川歸

黃柏

各三分

柴胡

細切

木香

草薺

各二分

人參

白朮

澤瀉

猪苓

各一錢

甘草

升麻

各半錢

芍藥

一錢

黃芪

二錢

蒼朮

陳皮

各一錢

黃連

麻黃

各二分

右細切分作二服每服用水一盞半煎至一盞溫服

○祖傳經驗三妙丸治濕熱下流兩脚麻木或如火烙之熱

黃柏

各一錢

蒼朮

六兩水

煎浸一宿

初服

川牛膝

去芦

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心姜
鹽湯下忌魚腥蕎麥熱麪煎炒等物

耳病 四十二

論

內經曰腎者作強之官技巧出焉又曰耳爲腎之外候一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳夫腎之爲藏水藏也天一生水故有生之初先生二腎而一陰藏焉而又有相火存乎命門之中也每挾君火之勢而悔所不勝經所謂一水不能勝二火是矣其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響甚爲可惡早而不治漸而至於龍鍾良可嘆哉治法宜瀉南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎有補而無瀉厥有旨哉

脉法

兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛
法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必
遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

方法

丹溪方
九條

丹溪曰大病後耳聾及陰虛火動而聾者宜補陰降火四物
湯加黃柏主之

○耳鳴宜當歸龍薈丸多飲酒人宜木香枳榔丸

○耳聾以茱萸烏頭尖大黃三味為末津調貼湧泉穴以引火
下行

○又方治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰吹之皆効

○又方治耳痛及聾耳用桑螵蛸炙黃為末加附少許吹入耳中

中極効或用鰾脂胚子蛙竹末加射香少許吹入妙

○又方治諸虫入耳用香油滴入耳中其虫即出或死於耳內
或用駝牛乳或雞冠血滴入皆好

○又方治諸虫入耳用桃葉捲作角子切齊其頭納入耳中其
虫從角中走出

○大補丸治耳鳴欲聾用黃栢一味不拘多少細切鹽酒拌新
瓦上炒褐色爲細末滴水丸如梧桐子大每服一百丸如
氣虛以四君子煎湯下血虛以四物湯下

○九耳鳴耳聾皆是陰虛火動或補腎丸或虎潛也或滋陰大
補丸皆好

○滋腎丸治耳鳴耳聾

黃栢鹽酒炒知母去毛酒肉桂半錢

東垣

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸淡鹽湯下

○柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴而聾

連翹四錢

柴胡三錢

炙甘草

當歸身

人參

各一錢

水蛭

五分炒

蜜虫

三箇去翹足炒為研

射香

少許另研

右除後三味別研外其餘細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞去粗一三味末子再煎一二沸食遠服

東垣

○蔓荊子散治上焦熱耳鳴而聾及出膿汁

炙甘草

升麻

木通

赤芍藥

桑白皮

蜜制

麥門冬

生地黄

前胡

甘菊花

赤茯苓

蔓荊子

各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗食後服

東垣
○黍粘子湯治耳癰生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍胆

各二分

黍粘子

連翹

生地黄

當歸稍

黃芩

炙甘草

黃連

各三分

柴胡

黃芪

各四分

桔梗

半錢

桃仁

三箇去皮尖另研

紅花

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食後服忌寒藥利

大便

○祖傳經驗秘方治耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水流
出或乾痛不可忍者用蛇退皮燒存性細研以鵝翎管吹入耳中立愈

論

目病

四十二

東垣曰按陰陽應象論云諸脉者皆屬於目又曰目得血而能視五藏六府之精氣皆上注於目而爲之睛睛之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲目窠之總絡氣之精爲目眼肌肉之精則爲約束裏楨筋骨血氣之精而與脉併而爲系上屬於腦後出於項是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合德而爲精明也是以五藏六府十二經脉三百六十五絡其血氣皆稟受於脾土而上貫於目而爲明故目者心之使也心者神之舍也故精神乱而不守卒然見非常之怪若邪中其睛則精散精散則視岐現一物爲而它因事煩擾飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛

則百脉沸騰血脉逆行經曰天明則日月不明邪害空竅是也夫脾者諸陰之首目者血脉之宗也故脾旺則五藏之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主藏神明宜靜而安相火化行其令相火乃包絡之火主百脉皆榮於目既勞後妄動又因邪氣所併而損血脉是故諸病生焉鑒目者若不先理脾胃及養血安神乃治標不治本是不明至理者也學者其可不用心乎

脉法

左寸脉洪數心火炎也關弦而洪肝火盛也

右寸關俱弦洪肝木挾相火之勢而來侮所不勝之金而制已所勝之土也

方

去冊溪方注

丹溪曰目病屬風熱血少神勞腎虛

○河間曰在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏當養血安神如暴失明昏澁翳膜眵淚班入眼皆風熱也一云班入眼此肝氣盛而發在標也宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

○瞳子散大皆辛熱所爲也辛主散熱乘之當除風熱涼血益血以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣之盛爲君當歸身生地黃養血涼血爲臣五味子酸寒體浮收瞳子散大地骨皮天門冬瀉熱補氣或用滋陰地黃丸最妙

○久病昏暗以熟地黃當歸根爲君羌活防風甘菊花之類佐之

○暴發赤腫以黃芩防風爲君以瀉之黃連當歸爲臣以養血
羌活柴胡升麻白芷甘草爲使白睛紅加白荳蔻少許

○又方治血熱壅痛四物湯加草龍胆防已防風羌活一云實
熱上衝眼痛用黃連瀉火當歸補血

○勞後飲食不節內障昏暗蔓荊子湯

蔓荊子

人參

甘草

炙

黃芪

黃栢

白芍藥

酒炒

右細切水煎服

○又方治眼痛用生地黃酒浸搗爛罨眼上又用草烏兩星乾
姜桂枝爲末醋調貼兩足心時用牛膝膏洗眼

○肥人風熱上壅眼目疼痛

防風

羌活

荊芥

酒苓

水煎服

○瘦人目痛乃是血少兼熱須用養血藥少加風藥

當歸

生地黄 酒洗

玄參

川芎

防風

荊芥

菊花

細切水煎服之

○滋因地黃丸陰

熟地黄 壹兩

生地黄 一兩半

天門冬

炙甘草

枳殼

地骨皮

黃連

五味子 各三錢

人參 二錢

當歸身 酒浸

黃芩 各五錢

右為細末煉蜜為丸如棗巨大每服一百丸茶清下

○秘傳撥雲退翳丸 又名神仙

治一切內外障膜遮睛昏暗大

効

瓜蒌根

枳實

甘草 炙

蔓荊子

薄荷 各五錢

川芎

木賊 童便浸一宿去節焙乾

密蒙花

荊芥穗

地骨皮

甘菊

白疾莉

羌活 各一兩

蛇蛻

蟬蛻

黃連

各三錢

川椒

七錢半 去目炒

當歸

酒浸洗

草決明

五錢炒

右為細末煉蜜為丸每兩分作十九每服一九食後臨臥

服日進三服翳障米飲下暗暗當歸湯下內障木香湯下

退雲丸

有犀角五錢乾地黃一兩無蔓荊子甘草川椒婦人當歸湯下有氣木香湯下

獨

○羊肝丸治一切目疾不問內外翳障青盲等証

白乳羊肝

去膜以刀去脂

黃連 一兩

甘菊花

防風

薄苛

去梗

荊芥穗

羌活

當歸

川芎

各三錢

右為細末將羊肝蒸熟同藥末杵爛為丸漿水下

東垣

○春雪膏點赤眼効

朴硝

不拘多火

置豆腐上蒸化待流下以簍器盛之

堦

○爛翳驗方

用茜草根燒灰以燈心點之須更大痛以百節草刮之

○神効明目湯治眼櫻緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澁難開

細辛二分

蔓荊子半錢

防風一錢

葛根一錢半

甘草二錢

一方加黃芪一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去相臨卧溫服

○明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火光眼睫成紐眵糊多隱海難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便

微硬

川芎二分

生地黃

酒浸洗

蔓荊子

各三分

當歸身稍

白茯苓

藁本

各四分

荊芥穗

五分

防風

麻黃根

羌活 各八分

細辛 少許

紅花 少許

川枳 四粒

桃仁 七箇尖細研去皮

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗臨卧稍熱服忌酒醋濕麪

○復明散治內障

青皮 去穢三分

陳皮 去白

川芎

蒼朮 各半兩

炙甘草

生地黃

連翹

柴胡 各一錢

黃芪 一錢半 當歸身 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服忌酒醋濕

麪辛熱大科物之類

○助陽和血湯治眼發之後微有上熱白睛紅隱澁難開睡多

眵淚

蔓荊子

一分

香白芷

三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身

酒洗

防風

各半錢

升麻 七分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

煉

○歸葵湯

一古連

治目中溜火惡日與火光隱澁難開小角緊

視物昏花迎風有淚

柴胡

三分

生甘草

蔓荊子

連翹

生地黃

當歸身

紅葵花

人參

各四分半

黃芪

酒黃苓

防風

羌活

各七分半

升麻

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

煉

○救苦湯治眼暴發赤腫臉高苦疼不可忍者

桔梗

連翹

紅花

細辛

各二分

當歸身

夏月減半

甘草

炙各一錢

蒼朮

草龍胆

各一分

羌活

太陽

升麻

陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連

各二錢

生地黃

黃柏

黃芩

知母

各三分

川芎

六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服若苦疼則多用苦寒藥煎治本經之藥再行加減如晴昏加知母黃柏

疎

○益陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯神

各二錢

生地黃

酒先

牡丹皮

山茱萸

當歸

稍酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

各五錢

熟地黃

二兩

右為細末勿犯鐵器熬搗煉蜜丸如梧桐子大每服五十

九空心淡塩湯下

○當歸龍胆湯治眼中白翳

防風

石膏各二分

柴胡

羌活

五味子

升麻各三分

甘草

酒黃連

黃芪

各四分

黃芩酒炒

黃柏酒炒

當歸身酒洗

草龍胆

酒洗各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗入酒少許熱服

○瀉陰火丸一名連栢益陰丸

石决明

三錢 羌活

獨活

甘草

當歸稍

五味子

防風各五錢

草决明

條黃芩

黃連酒炒

黃栢酒炒

知母各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如棗大每服五十九茶清下

東垣

○療本滋腎丸

黃柏酒炒 知母酒炒

各等分爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十九空

東垣

○加味滋腎丸

肉桂三分 黃連一錢 姜黃一錢 苦參三錢

苦葶藶酒洗 石膏覺肚冷勿用 黃柏酒炒 知母去毛酒炒

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服一百丸白湯送下
空心服以食壓之

東垣

○退翳膏治黑白翳

蕤仁 升麻各三分 連翹 防風

青皮各四分 甘草 柴胡各半錢 當歸身六分

荆芥穗

水半盞浸

生地黄

一錢半

黃連

三錢

右細末水一碗煎至半碗去粗更上火煎半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻磁器盛貯頻點之

○龍胆飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇蛻

炙甘草

各半錢

麻黃

一錢半

升麻

二錢

青蛤粉

草龍胆

黃芩

炒

羌活

右為細末每服二錢溫茶清調下

○還睛紫金丹治目眦歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以三稜

針刺目眦外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏

火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出翳

膜亦退用手法擦出內臉向外以針刺之出血

白沙蜜

二十兩

煨甘草

水內連水浸半日

黃丹

六兩

烏賊骨

二錢

硃砂

小瓶口上薰乾

射香

各一錢

白丁香

五分

輕粉一字

右將白砂蜜於砂石器內慢火熬掠去沫下甘草次下丹以柳枝撓次下餘藥以不粘手爲度作丸如雞頭實大每用一丸溫水化開洗之

○重明散治一切風熱內外障膜眼疾

川獨活

川羌活

川芎

吳射干

仙靈脾

防風

甘草

井泉石

蒼朮

各半兩

丹參

白朮

石決明

草決明

各三錢

石爲細末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日三服

問河

○石膏 活散治久患双目不明速年近日內外翳障風熱昏

暗倒睫拳毛一切眼疾頭風並皆治之

羌活

治風熱

蜜蒙花

治羞明

木賊

退翳

白芷

清利頭目

細辛

乾菜子

二味起

麻子

起拳

川芎

治頭風

蒼朮

明日煖

黃芩

洗心

甘菊花

荊芥穗

治目

石膏

治頭痛

藁本

治偏頭痛

甘草

解藥毒

右各等分爲細末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水調

下茶清亦可日進三服服至十日漸明二十日平安

○黃連膏治一切眼目疼痛瘀肉板睛風痒淚落不已

朴硝

一斗以水淘

白丁香

五升以水一斗淘淨

黃連

半斤

右量水入硝煮金內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者

取出控乾以帛袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清
汁晒乾入風硝更加猪羊膽和蜜令勻點眼極妙

○滌昏膏治一切風壅眼目疼痛不可忍者

白礞蜜一斤黃連一兩

沒藥半兩

黃丹

一兩

右以蜜同黃丹熬黑以水二大盞煎黃連成稠汁去粗入
前丹蜜內煎熬稠更入沒藥末同煎數沸濾去粗洗眼甚
妙

○金絲膏治一切目疾昏暗視物如絲羅所遮或痒或痛

宣黃連

半兩丙細切水一盞浸一宿取汁再添水

白礞蜜

一兩

白礞一字

井鹽

一分如無以情鹽代之

山梔子

二錢搗碎入煎黃連汁內加水同煎五七沸

右用銀器煎藥十餘沸用上細生絹加帛數重再濾過

銀錐子盛貯時常點眼

○地芝丸治不能遠視而能近視以此除風熱

生地黄 天門冬 各四兩 枳殼 炒 甘菊花 各二兩

右爲末煉蜜丸茶酒任下

○眼睫方 卽倒睫拳毛也

木鱉子 一箇 去殼爲末綿裹塞鼻中左目塞右右目塞左

一二夜其睫自正

○點眼光明丹治一切風熱上壅兩目赤腫流痛風弦爛眼及

內外翳障等証

白垺甘石 一兩 以黃連半兩煎濃汁煮去粗用炭火煨垺

辰砂 一錢 鵬砂 二錢 輕粉 五分 片腦 三分 多至

射香 一分 如赤眼腫痛加乳香沒藥各五分內外翳障

加珍珠半錢鴨嘴膽礬二分熊膽二分爛弦風眼加銅青半錢飛丹半錢或以諸藥摠合爲一以治諸般眼疾右各研爲極細末一處和勻再研一二日無聲銀瓶盛貯密封口不可令泄氣點眼極妙

○丹溪活套云東垣謂目能遠視不能近視火盛而水虧也法當補腎六味地黄丸主之目能近視而不能遠視有水而無火也法當補心定志丸加茯苓主之又曰不能近視膜服地黄丸不能遠視卧服定志丸是皆道手足少陰經也是以知不能近視者腎水虧火也不能遠視者心血不足也凡目暴發赤腫宜用羌活防風柴胡白芷升麻酒制芩連甘草生地黃當歸身白睛紅少加白荳蔻又曰凡眼暴發赤腫須以防風黃芩爲君當歸生地黃黃連和血瀉

火藥為臣使 几目久痛或內障昏暗須以熟地黃當歸
根為君以羌活防風菊花荊芥穗生甘草之類為佐使也
○祖傳經驗固本還睛丸治遠年一切目疾內外翳膜遮睛風
弦爛眼及老弱人目眇多糊迎風冷淚視物昏花等証悉
皆治之

天門冬

去皮心酒浸宿另作爛如泥

麥門冬

去心焙乾

生地黃

酒浸焙乾

熟地黃

酒洗淨再用薑蒸勿犯鐵已上各三兩

人參

半兩

白茯苓

一兩半

乾山藥

半兩一兩 枸杞子

川牛膝

一兩

石斛

酒洗一兩

草決明

一兩 杏仁

甘草

二兩

鬼絲子

一兩

羊角

一兩 烏犀角

一兩

甘草

二兩

五味子

防風

八錢

甘草

七錢

白茯苓

七錢

黃連

七錢

枳殼

一兩

川芎

七錢

青柏子

八錢

微

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九粒湯下

○經驗復明膏去翳膜立効

人參一錢半川歸一錢半 鵬砂一錢半 青垣一錢

乳香研一錢另沒藥研一錢另 芦荟一錢 珍珠半錢

射香加半錢後黃丹一兩水飛海漂硝五錢 黃連四錢

黃柏六錢 赤炉并石淬次白沙蜜半斤 麝仁五錢去壳

白歛一錢半 右件各研爲極細末先將白蜜更沸掠去上

不 沫再熬滴水中沈碗底方散可用然後入前藥末更沸撈

勻磁罐收貯日三五次點之効

口病 四十三

論

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌

夫口之爲病或爲重舌木舌或爲糜爛生瘡或見酸苦甘辛鹹味原其所因未有不由七情煩擾五味過傷之所致也經曰陰之五宮本在五味陰之五宮傷在五味是也是以肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹有口淡者知胃熱也外有謀慮不決肝移熱於膽而口苦者亦有脾胃氣弱木乘土位而口酸者或膀胱移熱於小腸腸不便上爲口糜生瘡潰爛則傷寒孤感之証上唇生瘡虫食其藏下唇生瘡虫食其肝其爲口之爲病種種不同醫者宜各類推而治之無有不安者也

脉法

經曰左寸洪數心熱

右寸浮數肺熱口辛

左關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸

右関沈實脾胃有實熱口甘無洪數者口瘡或爲重舌木

舌脉虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈宜理中湯

方法 附溪方法
九三條

丹溪曰脾熱口甘三黃丸主之

三黃丸煎治五勞七傷消渴不生肌肉

黃芩 春四夏秋
六冬三兩 黃連 春四夏五
秋三冬二

大黃 春三秋二夏
一冬五兩 和

右三味煉蜜爲丸如梧桐子大每服五丸未知加至七丸

日三服一月病愈久服行及奔馬 愚按此方惟實熱
者可用虛者勿用

○膽熱口苦謀慮不決所致小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨

皮遠志煎服

○益膽湯治謀慮不決肝胆虛氣上溢則口苦証

黃芩 去標

甘草 炙

人參 銼

官桂 半錢

苦參

扶神 各三分

遠志 取肉去骨七分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○柴胡地骨皮湯治膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜生瘡潰爛心胃壅熱水穀不化等証

柴胡 去蘆

地骨皮 各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞食後溫服如病人大段實者加大黃朴硝以利之

○治口瘡用西瓜漿水徐徐飲之無瓜時以瓜皮燒灰付之

○又方細辛黃柏 炙 各等分為末搽舌上吐涎乃愈

○又方用焰硝鵬砂含口勿開外以南星為末醋調貼足心湯漱穴上神効

○又方用好酒煮黃連成汁呷下即愈

○又方用五倍子一兩黃柏蜜炙滑石各半兩銅綠半兩射香一字爲末摻之極効

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上無制用理中湯反治之而愈甚者加附子或用官桂噉之亦妙

○又方治赤口瘡

白礬

枯

沒藥

乳香

銅綠

右爲細末摻之

○又方治白口瘡

雄黃

沒藥

乳香

各一錢

輕粉

巴豆霜

許

右爲細末摻之

○治實熱口中生瘡用

涼膈散

甘桔湯皆効

○一小兒口瘡不下食衆以狐惑治之必死後以礬湯於脚上

浸半日頰寬更以黃栢蜜炙殭蚕炒爲末付之而愈

○又方治唇緊燥裂生瘡用青皮燒灰付之立愈

○又方治唇緊以皮帛撚於刀上薰取瀝付立効

○又方治口瘡用野薔薇花根煎湯漱之一云白薔薇根并汁付之

○又方治口内生瘡用

明礬枯

黃丹炒

鹽白梅燒存性各一錢

人中白煨半錢

射香少許另研

右爲細末乾摻口內甚者加鵬砂半錢片腦一分

○鵬砂散治口舌生瘡及咽喉腫痛皆効

鵬砂

馬牙硝

活石

寒水石

枯白礬

各二錢片腦二分

右爲細末每服半錢許食後新汲水調下

○碧雪治口瘡及咽喉腫痛神効

蒲黃

青黛

鵬砂

煅硝

生甘草

各等分爲細末付之咽喉腫痛搗管吹入

○祖傳經驗方活腫大塞口不通飲食者

真蒲黃一味

頻刷舌上自退若能嚙藥即以黃連一味煎

濃汁細細呷之以瀉心經之火則愈

○丹溪活套云肝膽有實熱令人口酸而苦小柴胡湯加甘草

龍胆青皮之類甚者當歸龍會丸若謀慮不決肝膽虛而

苦者人參遠志茯神甘草爲君柴胡草龍胆爲佐使甚者

錢氏地黃丸虛者補其母也○心熱而口苦或口舌生瘡

黃連瀉心湯牛黃清心丸涼膈散之類○脾熱而口甘者

三黃丸平胃散之類○肺熱而口辛者甘桔湯瀉白散金
沸草散之類○腎熱而口鹹者滋腎丸大補陰丸滋陰大
補丸之類

論

內經曰一陰一陽結謂之喉痺王註謂一陰即厥陰肝與胞絡是也一陽即少陽膽與三焦是也四經皆有相火存焉手和曰膽與三焦尋火治肝和胞絡都無異東垣曰火與元氣不兩立一勝則一負蓋元氣一虛則相火隨起而喉痺等暴病作矣夫喉之爲會厭者經謂之吸門是也以其司呼吸主升降爲人身緊關之橐籥門戶也若夫卒然腫痛水漿不入言語不通死在頃刻誠可經駭其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾易治會厭之一邊腫者俗謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳經曰一水不能勝二火又曰一水不能勝五火甚言其真水之易虧而相火之易動也如

大怒則火起於肝房勞則火起於腎飲食失節則火起於脾胃之類是故知火者痰之本痰者火之標火性急速故病發則暴悍治之之法必先大湧其痰或以鉞鍼刺其腫處此急則治標之法也用藥者必須以內經從治之法而以桔梗甘草玄參升麻防風羌活荊芥人參白朮茯苓之類少加乾姜附子等藥爲嚮道徐徐頓與不可頓服此爲治之大法也切不可驟服寒涼之藥非徒無益而且促其死耳俗人未諳此理而峻用芩連梔柏之類而正治之又甚者雜進以大寒草藥頓與頓服但覺腫勢稍退語言畧通而鑒者病者皆爲獲効而喜殊不知上熱未除中寒復生其毒氣乘虛而入腹漸而至於發喘不休不可治矣良可嘆哉外有天行一種名曰大頭病俗呼爲裡頸瘟其証甚爲凶惡染此者十死八九宜

相運氣治之治法亦不甚相遠也東垣普濟消毒飲子甚妙實為百發百中之劑學者再宜詳究而擴充之務活人於斯世也幸甚

脉法

兩寸脉浮洪而溢者喉痺也 脉微而伏者死

方法

丹溪方法
凡十一條

重者

丹溪曰喉痺多屬痰宜用吐法或只以桐油灯脚用鵝翎探吐之病輕者新取園中李實根噙之更研水於項上付之

盧氏曰按本草蠡實根即馬蘭草根也龍治喉痺此方多有之此又曰園中李實根未知孰是

○纏喉風屬痰熱亦宜吐之

○又方用遠志去心為末水調付項上

○又方用燈心草燒灰吹入喉中

○一方治咽喉腫

荊芥穗

當歸身

桔梗

甘草

各等分

右細切水煎放溫漱而服之有熱加黃芩枳殼宜刺少商出血立愈

○又方治喉乾燥痛用四物湯加桔梗荊芥黃栢知母立已

○又方治喉瘡痛者多屬虛火遊行無制用人參黃栢

蜜炙

荊芥

虛火用人參竹瀝血虛用四物加竹瀝

○又方治黃檗郎根

谷名剉

入好酒少許研汁滴入喉中愈

○又方以灯籠草炒焦爲末酒調付喉中

鴻寶熱火黃連荊芥液奇硝石爲末姜汁蜜調噙化

○喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而急者惟用砭針刺血最爲上

東垣

東垣

策

○通關飲治喉痺腫痛不能語言者但可進藥無不愈者此從

治之法也

一方有黍粘子無白木芪苓乾姜附子各利瞞湯治一切咽喉生瘡腫痛

人參

白朮

茯苓

各一錢炙甘草一錢半

桔梗

去芦二錢

防風

去芦七分

荊芥

半錢

波菴

半錢

乾姜

炮半錢

或加附子

炮半錢

右細切作一服水二盞煎七分徐徐與之

○又方治喉痺用鴨嘴膽礬三分或半錢吹入喉中吐痰愈

○普濟消毒飲子治天行喉痛等証

方見瘟疫門

○桔梗湯治咽喉微覺腫痛聲破難語

當歸身

馬勃

各一錢

白僵蚕

黃芩

各三分

麻黃

去節五分

桔梗

去芦

甘草

炙各一錢

桂枝

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○又治喉痺方新取青艾葉杵汁灌入喉中即愈

○又方治蛇床子於有嘴瓶中燒令病者以瓶嘴布口中吸煙入喉內立愈

○吹喉散治咽喉一切腫痛

綠礬半兩別用青魚膽一箇以礬研細入胆內巴豆七粒

朴硝二錢半另研銅青一錢 輕粉五分 青代些少另研

右將膽礬同巴豆肉於銅鉢內飛過去巴豆合朴硝已下四味再加射香少許研勻每用一字吹入喉中吐出痰血立愈

○聖煙筒治喉痺葷子取肉槌碎帛捲作筒燒煙吸之

○祖傳經驗秘方治喉痺神効

馬蘭菊

五介龍草

車前草

俗名蝦蟆衣

右以三物杵汁徐徐飲之

○又方治喉痺及喉中熱痛等証用上好消梨杵汁頻頻飲之如患者能自嚼燕下亦可多食爲良大解熱毒惟金瘡產婦及諸脫血証不可食以其破血故也其餘一應癰亦然痘背等証多食極妙

齒病

四十五

論

內經曰有病之起有生於本者有生於標者夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脉貫絡於齒上齦手陽明大腸之脉貫絡於齒下齦手陽明惡寒飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其爲痛有惡寒惡熱之不同也有開口呬風則痛

甚者腸胃中有風邪也有開口則穢臭不可近者腸胃中有積熱也或謂痛而齒動搖或謂痛而虫侵蝕又有齒縫踈豁飲食不便者比比是也大抵齒齲宣露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎爲要憎寒惡熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火爲良其所謂風邪虫蝕之証蓋因熱生風而風生虫也腸胃之火既平更加以擦牙誅虫之藥以治其標無有不安之理也學者詳之

脉法

右寸關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛

尺脉洪大而虛者腎虛主齒動搖踈豁相火上炎而痛

方法

冊溪方
法九二條

冊溪曰牙疼或出血屬熱胃中有熱有風寒有虫有濕熱實

熱腫痛調胃承氣加黃連又用升麻白芷防風荆芥薄荷甘草桔梗之類外用梧桐淚射香擦之

○灸法上引痛灸足三里二穴

在足陽明經膝下三寸胫骨外大筋內陷中灸七壯

下引痛灸手三間二穴

在手陽明大腸經掌後內側陷中手陽明大腸經掌後內側陷中

○治虫牙痛用韭菜子以黃蠟包之外以瓦片燒紅將韭菜子攪

丸置爲其上又別糊一帛袋如巨螺樣上以小竹管爲袋

嘴將袋覆於蠟丸上以竹管拄於齒齦中接煙薰之其虫

即死而愈

○治走馬牙疳方其効如神

乾姜

南棗

各燒存性

枯白礬

右件各等分爲末付之即愈

○小兒走馬牙疳床一齊腐爛即死此方神効

婦人尿桶中白垢火煨一錢入銅綠三分射香一分半付

之立愈

○射香散治熱多寒少牙齦露肉脫血出齒動欲落疼痛妨食

忤寒少忤熱多

熟地黄 二分 益智仁 二分半 當歸身 生地黄

麻黃根 酒漢防已 人參 各半錢 升麻 一錢

草豈慈 黃連 各一錢半 羊脰骨灰 錢二 射香 火許

右爲末先用溫水漱口淨擦之

○草豈慈散治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉 防風 各二分 羊脰骨灰 熟地黄 各半錢

當歸 六分 草豈慈 黃連 各一錢 升麻 二錢半

右爲細末如前法擦之

○羌活散治客寒犯腦及風寒素襲腦痛項筋急牙齒痛動搖肉齟袒脫疼痛

藁本

香白芷

桂枝

各三分

蒼朮

升麻

各半錢

當歸身

六分

草薢

一錢

羌活

半錢

羊脛骨灰

二錢

麻黃

去根節

防風

去芦各三錢

柴胡

五錢

細辛

少許

右爲細末如前法擦之立愈

○白牙散

白芷

七分

升麻

一錢

石膏

一錢半

羊脛骨灰

二錢

二錢

射香

少許

右爲細末如前法擦之立効

○獨聖散治一切牙痛風痺等証

北地疾梨

不拘多
火陰乾

右爲細末每用刷牙以熱漿水漱牙外應末漿水刷牙
大有神効

垣東

○立効散治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下

三部陰盛陽虛是五藏內盛六府陽道脉微小小便滑數

細辛分三

炙甘草錢

升麻分七

防風錢一

草龍胆

酒洗
錢三

作 右爲細末切壹服水一盞煎至七分去粗以匙抄在口中

蝶痛處待少時則止○如多惡熱飲更加草龍胆一錢此

法不定隨寒熱多少臨時加減 若更惡風作痛加荳蔻

黃連各五分勿加草龍胆

○牢牙散治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙齒動搖欲落牙齒不

長牙黃口臭

羌活

一兩

草龍胆

酒洗一兩

羊脛骨灰

二兩

升麻

四兩

六為細末

臨臥時貼牙齦上

○清血散治因服熱藥或食辛熱之物致使上下牙疼痛不可

忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡

熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身

黃連

夏月倍用

生地黄

酒制三分

牡丹皮

半錢

升麻

一錢

右為細末作一服水一盞半煎至一盞瀝去粗帶涼服

○神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦肉將脫牙

齒落血不止

蘭香葉

如無蘭香代之

當歸身

藿香葉

木香

各一錢升麻 二錢

生地黄

酒洗甘草 生各三錢

黃連

酒洗縮砂仁 各五

右共爲細末湯浸蒸餅爲丸如棗豈大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服○此藥兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色或黑色及腸癖下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木血氣上衝逆氣上行妄聞妄見者皆効

○祖傳經驗秘方治胃有實熱齒痛或上牙痛尤甚者用涼膈散以大黃酒蒸爲君加知母石膏升麻爲佐頻頻含嚥即愈

○又方治胃熱齒痛口臭穢不可近者用大黃荆條一二十斤於火上烹瀝入姜汁六分之一時時含嚥甚効

東垣

○麗澤通氣湯治鼻不聞香臭

黃芪八分

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

各六分

炙甘草

四分

麻黃

冬月加鄭川椒

白芷

各二分

右細切作一服加生姜三片棗二枚葱白三寸水二盞煎至一盞溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐卧

東垣

○溫肺湯治鼻不聞香臭多眵淚

丁香二分

防風

炙甘草

葛根

羌活

各半錢

升麻

黃芪

各七分

麻黃

冬月加一錢半

右細切作一服水二盞葱白三根煎至一盞食後溫服
○禦寒湯治寒氣風邪傷于皮毛令鼻壅塞咳嗽上喘

黃連

黃柏

羌活

各二分

炙甘草

佛耳草

款冬花

白芷

防風

各三分

升麻

人參

陳皮

各半錢

蒼朮

七分

黃芪

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

○祖傳經驗秘方治鼻中時時流臭黃水甚者腦亦時痛俗名
控腦砂有虫食腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲
細末酒調服之即愈

○文方用治白牛毛振葉

如白楊木葉
香辣者是

焙乾爲末吹入鼻中立

愈

血証 四十七

論

內經曰大怒則形氣絕而血苑於上又曰怒則氣逆甚則吐血又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血又曰溫淫汗出爲孰衄又曰脾移熱于肝則爲驚衄胞移熱于膀胱則癰而溺血又曰結陰者便血一升再結二升三結三升又曰吐則血歸肝肝受血而能視

一云目得血而能視此云肝者蓋目爲肝之外候

足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝又曰心出血肝納血肺出氣腎納氣夫人身之氣血者精性之所依附並行不悖循環無端經曰一息不運則機緘窮一毫不續則害壞判若夫暴喜傷心則氣緩而心不出血故肝無所受或暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故其血無所歸又善勞過度

以致陰火沸騰血從火起故錯經而妄行也是以從肺而上
溢于鼻者曰衄血從胃而上溢于口者曰嘔血夫所謂咯血
唾血者出于腎也咳血嗽血者出于肺也又有痰帶血絲出
者或從腎或從肺來也其血出于小便者曰溺血曰血淋出
于大便者曰腸風痔血糞前來者曰近血糞後來者曰遠血
流結于腸胃之間而成積者曰血瘕血蟻大抵血從下流者
爲順易治血從上溢者爲逆難治丹溪曰口鼻出血皆是陽
盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降
則血歸經又曰諸見血爲熱証正經所謂知其要者一言而
終不知其要者流散無窮此之謂也

脉法

內經曰脉來如懸鉤爲衄血常脉脉至而搏血衄身熱者死

陽辟下膿血脉弦絕則死滑大則生血溫身熱者死

脉經曰脉得諸澁濡弱爲亡血 脉來輕輕在肌肉尺中自

浮目睛暈黃衄血未止

太陽脉大而浮必衄吐血 病人面無血色無寒熱脉沉

弦者衄也

脉浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

脉極虛氣遲爲清殺亡血失精

脉芤爲失血 溜爲少血 脉弦而緊脇痛肝藏傷主有

瘀血 吐血唾血脉滑小弱者生實大者死

唾血脉堅強者死滑濡者生

方法

丹溪方九
二上七條

丹溪曰口鼻血出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出

上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

按此語雖見前論蓋一章之大旨故重以示學者

○衄血涼血行血為主犀角地黄湯入鬱金

○一方用荊芥穗研服或用羅筒上半段杵汁服又以汁滴入鼻竅中或灸大椎及啞門穴二三壯俱可止之

○本草衍義以豈草葉洗淨研汁一盞入生姜汁三分之一細細呷之治大熱衄血

○吐血是火載火上錯經妄行脉必大而芤大則發熱芤則虛

○大法四物湯加炒梔子童便姜汁竹瀝

○一方用韭汁一云凡血逆行或吐血或嘔血或見血暈氣用韭汁服之最妙童便姜汁磨入

鬱金飲之其血自清如無鬱金以山茶花代之一云用鬱金末以姜汁童便和好酒調服

○吐血大全良方四生丸甚妙亦治衄血

○又方童便調姜附末服之

○又方童便二分酒一分搗側柏葉溫飲之

○吐血因有亦怒而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血

○一方治吐血不止用乾姜炮爲末童便調服

○山梔子最能清渭脘之血

○有先吐血後有痰者是陰虛火盛四物湯爲主加痰火藥若先吐痰而後血多者是積熱降痰火爲急

○有暴吐紫血成塊者是熱傷血結于中吐出爲好用四物湯加清熱等藥調之

○唾血鮮血隨而出出于腎亦有瘀血內積肺氣壅遏不能下降用

天門冬來門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志或加乾

姜

○咳血

熱出裏
內有血

痰盛心熱多是血用青代瓜蒌仁訶子貝母

海石山梔子爲末姜汁蜜丸噉化嗽盛者加杏仁後以八

物湯加減調理

痰盛者宜
更加涼藥

○咯血用姜汁童便青代入血藥中用四物湯地黃膏牛膝膏

之類

有咯血痰帶血絲出
者同治但宜加寒藥

○舌上無故出血如線用槐花炒爲末摻之一方用蒲黃炒焦

爲末付之極妙

○大便下血有熱有虛熱用四物湯加炒山梔子升麻秦艽阿

膠重用四物湯加乾姜炮升麻

○便血用白芷五倍子爲丸服効

○便血有風邪下陷者蓋風傷肝肝主血故也宜升提之四物

湯加防風荆芥升麻柴胡秦元槐花條芩地榆只壳煎服
○有濕傷血者宜行濕消熱蒼朮白朮黃連黃柏當歸川芎芍
藥地榆槐花水煎服之

○因積熱下血用蒼朮陳皮各一兩半連喬五錢黃連黃芩黃
柏各七錢半炒爲末生地黄膏丸服

○腸風下血獨在胃與大腸出用黃芩秦元槐角青代升麻

○一方用大黃煨杏仁去尖各三錢當歸槐柳皂角仁黃柏荆

芥穗只壳各五錢蛻皮炙黃連炒秦元槐角子各一兩

右爲末麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下如
鮮血下甚者棕栢灰蓮房灰各五錢

○凡經血逆行或血腥或吐血唾血用韭汁服自清

○人參飲子治衄血

溪丹

東垣

此丹

麥門冬一錢 當歸身一錢 人參 黃芪各一錢半

白芍藥 甘草各一錢 五味子九枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○痰涎雜血出于脾葛根黃芪芍藥黃連川歸沉香末甘草水

煎服

○三黃補血湯治吐血

黃芪 川歸 柴胡各一錢 熟地黃

川芎各一錢半 芍藥 生地黃各三錢 牡丹皮

升麻各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○一方治痰嗽吐血

紅花 杏仁去皮煎 枇杷葉拭去毛姜汁塗炙黃

垣東

紫苑茸

鹿茸炙

木通各兩

大黃半斤

右為細末蜜丸龍眼大噉化

○黃芪散治咳血成勞

黃芪

麥門冬

熟地黄

桔梗

白芍藥各一錢

甘草半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○一方治痰帶血咳出

白朮一錢

川歸

芍藥

牡丹皮各一錢

桃仁研錢

梔子七分半

甘草三分

麥門冬半錢

右細切水一盞半煎至一盞去粗溫服

○雞蘇散治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇即菝葜

黃芪

生地黃

阿膠珠

生濟

垣東

東垣

具母

白茅根各一錢桔梗

麥門冬

蒲黃

炒黑色甘草各半錢

細切水煎服

○薏苡仁散治肺損嗽血

薏以仁

不拘多少右一味研爲細末以豬肺一箇煮熟蘸藥

食之

方溪

○又方用猪心一箇竹刀批開入沉香末一錢重大半夏七箇

入在心中帛包數重外以童子小便沃濕漉火煨熟取去

半夏吃之嗽血吐血皆効

方溪

○一方治弱血山梔子飲

梔子

不拘多少炒黑色

右爲細末水煎連粗服之

方溪

○一方用小薊根琥珀二味爲末水煎服之蓋二物能治下焦

方溪丹

熱結血淋

○又方治溺血神効

生地黄四分小蓟根

滑石

通草炒

蒲黃炒淡竹葉

藕節

當歸酒浸

山梔子炒黑甘草炙各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○治溺血因血虛者用四物湯加牛膝膏服

○一方治溺血用五苓散合四物湯煎服効

○九用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加辛溫升

藥如加涼藥用酒煮酒炒之類乃寒因熱用之法也

○一方治小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散

○犀角地黄湯治衄血及吐紅

方局

醫事正統

卷之五

天

三

犀角 鎊

赤芍藥

牡丹皮

生地黃

各一錢

右細末切作一服水煎食後服

方局

○四生丸治吐血衄血陽棄於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生地黃

生側柏葉

右各等分細研爲丸如彈子大每服一九水煎或鹽湯下化

方溪冊

○聖餅子治咯血

青代一錢

杏仁

四十粒以黃蠟煎沙黃色

右研杏仁細入青代捏作餅子用時以柿餅一箇破開以藥餅置於柿中合宜濕帟炮包煨連柿研細米飲調

○地榆湯治結陰便血不止漸而極多

地榆 四錢

生甘草 一錢半

炙甘草 一錢

宿砂

七枚

東垣

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○結陰丹治結陰腸風藏毒下血等証

枳壳

歲灵仙

黃芪

陳皮

檳榔根皮

何首烏

荊芥穗

各等分

右細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五七十九清米飲入醋少許送下

○椿皮散治血痢及腸風下血神驗

檳榔根白皮

二兩 槐角仁 四兩

枯白礬

二兩

炙甘草

一兩

右爲細末米每服三錢清水飲調下

○烏梅丸治大便下血如神

殭蚕

一兩

烏梅肉

一兩半

右爲細末醋糊爲丸醋湯下三五十九空心服

生

事本

○槐花散治腸風藏毒下血

槐花

側柏葉

荊芥穗

枳壳

麩炒黃色

右各等分為末每服二錢空心米飲調下

垣東

○加減四物湯治腸風下血

側柏葉

生地黃

當歸

川芎

各八分

枳壳

麩炒

荊芥穗

槐花

炒

甘草

炙各四分

地榆

條黃芩

防風

各六分

烏梅

大者一箇

右細切作一服加生姜三片煎至一盞去粗空心溫服

垣東

○當歸和血散治腸澼濕毒下血

槐花

炒

青皮

各六分

當歸身

升麻

各一錢

川芎

四分

荊芥穗

熟地黃

白朮

各六分

右為細末每服三錢米飲調下

東垣

○枳壳散東垣曰血清而色鮮者腸風血濁而黯者為藏毒黃

前來者為近血糞後來為遠血此藥並皆治之

枳壳上兩錢炙甘草三錢炙

右為細末每服一錢空心米飲調送下酒煮黃連丸

東垣

○酒煮黃連丸

黃連去鬚十兩好酒五升

右將黃連細切以銀石器盛酒煮黃待乾盡為度焙乾為

末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九空心服

方局

○秘方枳壳湯治大便腸風下血

枳壳一兩黃連一兩同炒去不用

右二味量水煎濃汁食前溫服

方局

○槐角丸治五種腸風下血痔漏脫肛並皆治之

槐角 二兩

地榆

黃芩

當歸

防風

枳殼 麸

右各等分爲細末酒麪糊爲丸如梧桐子大每服五十九
空心清水飲送下

通東

○升陽去熱和血湯治腸辟下血另作一派其唧唧然出者有
力而遠四散如篩腸腹中作痛熱毒所作也

陳皮 二分

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂 各三分

生地黃

牡丹皮

生甘草 各五分

升麻 七分

炙甘草

黃芪 各一錢

白芍藥 一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○生地黃散治鬱熱衄血咯血吐血等証

河間

枸杞子

柴胡

黃連

地骨皮

天門冬

白芍藥

甘草

黃芩

黃芪

生地黃

熟地黃

各半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○玉屑膏治熱血

黃芪

人參

右二味各等分爲末用蘿蔔大者切片厚一指許四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾尺蜜二兩爲度勿令焦點藥末吃不拘時仍用鹽湯送下

三因

○龍骨散治衄血不止凡九竅出血皆可止之

龍骨

不拘多火

右一味細研吹入鼻中即止

方

○射香散治鼻衄不止

白礬枯

龍骨各五錢

射香一分半

右各另研和勻每用時先以冷水洗鼻孔淨然後用藥吹入孔內或以濕帛蘸蘸入亦妙

○經驗方治瀉血

百藥煎

一兩以半兩燒灰存性

右共研細飯丸如梧桐子大每服三四十九或以米湯調下末子二三錢亦可

○又方治前証用乾柿餅燒灰存性清米飲調下二三錢立止

○桃仁承氣湯治男子婦人血結膏手不可近及中焦畜血妄言見鬼昏迷如狂及久病胃脘疼痛畜血等証

○抵當湯治下部蓄血臍下結痛滿硬等証

二方並見寒傷門

○丹溪活套云凡諸見血証皆是陽盛虛陰君相二火亢甚煎

活人

活人

傳世

迫其血而出諸竅也悉宜四物湯加知母黃柏補陰降火之劑爲主治○如衄血咳血或痰帶血絲出者皆從肺中來也本方加酒洗薄黃芩茅花等藥以瀉肺火如嘔血吐血此從胃中來也本方加石膏知母等藥以瀉胃火○噎血咯血及潮熱咳血此血從腎中來也本方用梔栢皆當以鹽酒炒更加肉桂一分許以瀉腎火如小便血於溺竅中出澁數成淋作痛或雜尿而出者從此膀胱中來也本方加梔子仁瞿麥牛膝滑石之類以瀉膀胱之火○如小便出血不痛者此心移熱於小腸故曰血從精竅中出也本方加黃連梔子條苓之類以瀉本經之火○大便未糞而血先來者謂之近血知其從大腸中來也本方加槐柳枳實槐花條苓之類以瀉大腸之火○如大便糞而血來

者謂之遠血知其從小腸中來也本方加木通蔓炒黃連
之類以瀉小腸之火○夫血出於口鼻者或加犀角冬連
之類以清之或加茅花藕節棕梠灰炒蒲黃之類以止之
或加韭汁童便山茶花牡丹皮之類以消之○其血出於
大便者或加槐花側柏葉條荅之類以清之或加地榆荆
芥白芷等根之類以止之○其血出於小便者或加瞿麥
麥門冬梔子仁之類以清之或加滑石木通大小蓀之類
以行之或行之或清之或止之皆當視其新緩急而施治
之俱以四物爲君主之藥也

○祖傳經驗秘方

治小便溺血用車前草葉金陵草葉俗名墨斗草二味搗取自然
汁一盞空腹飲之立止

○又髮灰丸

用小兒胎髮如無以壯年無病人頭髮剪下者爲上自落者次之燒灰細研別用新取側柏葉搗汁調糯米粉打稠爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下或煎四物湯送下尤妙空心服之

○又方治大便下血用篋竹葉燒灰存性米糊爲丸如梧桐子大每服七八十九空心米飲送下

○一男子四十余素年飲酒無度得大便下血証一日如廁二三次每次便血一升許予以四物湯加條苓防風荊芥白芷槐花等藥連日與服不効後用橡斗燒灰二錢七分調入前藥汁內服之又與灸脊中對臍一穴血遂止而平安其病自此不發

痔漏 四十八

論

經曰因而飽食筋脉橫解腸辟爲痔又曰痺胃者倉廩之官
五味出焉大腸者傳道之官變化出焉若夫飽食太過則脾
氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清濁混淆故食積下流於
大腸之間而爲病也蓋脾胃一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦
從而虛其肝木得以乘虛下流而爲腸風病則是皆金失所
養木寡千畏之所爲耳其爲變見名狀種種不同曰牛妳曰
鼠妳曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸曰外痔
曰雖爲狀不一而其因則同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子
槐花之類以辛溫和血川歸川芎桃仁之類風邪在下以秦
艽防風升麻之類提之燥熱拂鬱以大黃枳殼麻仁之類潤

之違此疾者自宜慎口節欲依法調治無有不安者也

脉法

脉沉小實者易治 浮洪而輻弱者難愈

方法

丹溪方法
九十條

○一丹溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也治血為主大法用苓
涼大腸人參黃連生地黃槐角涼血生血當歸和血川芎
升麻枳殼寬腸

○漏瘡先須用補藥以補氣血參芪歸朮為主大劑服之外以
附子爲末津和作餅子如錢厚以艾多灸之漏大者艾炷
小亦大漏者艾炷亦小灸令微熱不可令痛餅乾即易之再
和再灸又以補氣血藥作膏藥貼之

○一方治痔瘡腫痛用蝸牛一名蝸陰乾爲末付之即愈或用香

油浸蝸牛月餘而以其油沫之亦効

○洗藥用五倍子扑硝双寄生蓮房煎湯先薰後洗

○又方治痔瘡風腫疼痛用胡麻子煎湯洗之其腫即消

○又方用木鼈子五倍子共爲細末調付

○塞藥用煆甘石煆以童子尿淬之牡蛎煆共爲末付之

○又方用馬蘭草根研細付上片時看肉平藥稍遲恐肉反

○腸風獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青代升麻

○一方用大黃煆桃仁去尖各三錢蛭皮黃連秦艽槐角子

各一當歸枳柳皂角仁黃栢炒荊芥枳壳各五錢爲末

糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下如下鮮血者加

棕栢灰蓮房灰

○秦艽羌活湯治痔漏成塊下垂不任其痒

羌活

二錢二分

秦艽

黃芪

各一錢

防風

去芦七分

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡

各五分

藥本

三分

細辛

紅花

各火許

右爲細切作一服水煎服忌寒風處大小便

○秦艽蒼木湯治痔核已破謂之痔漏大便秘澁必作大痛此

濕熱風燥四氣合而爲病故大腸頭成塊者濕也作大痛

者風也大便燥結者熱受火邪也其西方肺金主氣其體

收下亦助病爲邪須當用破氣藥煎之其効如神

秦艽

去芦

桃仁

去皮炙另研

皂角仁

各一錢

蒼木

米泔浸

防風

各七

黃柏

酒洗五分

當歸稍

酒洗

澤瀉

各三分

枳榔

二分另研

大黃

小許雖大便過澁亦不可多用

右件除枳榔桃仁皂角仁三味另研外餘藥細切作一服

垣東

○秦亢當歸湯治痔漏大便結燥疼痛

古人治此疾多以歲月待除之惟此藥一服即愈

水三盞煎至一盞二分去粗入枳榔等三味末子再上火
煎至一盞空心熱服待少時以美膳壓之不犯胃氣也服
藥日忌生冷硬物及酒濕麪大料椒姜等物若犯之其藥
無効如有白膿加白葵花頭五朶去萼心青皮半錢入正

藥中同煎木香三分為細末同枳榔等三味依前煎服餌

大黃

煨四錢

秦亢

去芦

枳實

各一錢

澤瀉

當歸稍

皂角仁

白木

各五分

紅花

少許

桃仁

二十箇去尖研細

右細切作一服水三盞煎至一盞食前服

忌如前

○秦亢防風湯治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔

垣東

漏也此藥主之

秦光

防風

當歸身

白朮

各一錢半

炙甘草

澤瀉各六分

黃柏

酒洗五分

大黃

煨

陳皮

各三分

柴胡

升麻

各二分

桃仁

三十箇去尖另研

紅花

少許

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱空心服之避

風寒忌房事酒濕麪大辛熱之物

○當歸郁李仁湯治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛

郁李仁

皂角仁

各一錢

枳實

七分

秦光

去芦

麻仁

當歸稍

生地黄

蒼朮

各半錢

大黃

煨

澤瀉

各三分

右細切作一服除皂角仁為末用水三盞煎至一盞去粗

入皂角仁末和勻空心服忌如前

○紅花桃仁湯治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸辟為痔治

法當補北方瀉中央

黃栢半一錢

生地黃一錢

澤瀉八分

蒼朮六分

當歸稍

漢防已

防風稍

猪苓各半錢

麻仁二分

紅花少許

桃仁十个

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服忌如前

○七聖丸治大腸疼痛不可忍脉訣云積氣生於痺藏傍大腸

疼痛陣難當但令稍瀉三焦火莫慢多方立紀綱

羌活一兩

郁李仁湯浸去皮尖另研

六黃八錢

楨榔

桂心

木香

川芎各五錢

右除郁李仁另研細入外其餘共為細末陳蜜為丸如梧

桐子大每服三五十丸白湯下食前服取微利一服而愈
切禁不得多利大便秘其痛滋甚

東垣

○秦艽白朮丸治痔疾并漏有膿血大便秘硬疼痛不可忍

秦艽 去苦

桃仁 去皮 犬研

皂角仁 煨存性 各一兩 當歸稍 酒浸

澤瀉

枳實 炒 黃色

白朮 錢各五 地榆 三錢

右為細末和桃仁泥再研勻麪糊為丸如雞頭實大令藥
光滑焙乾每服五七十丸白湯空心下待少時以美膳壓
之忌生冷硬物冷水冷菜之類并酒濕麪及辛辣大料熱
物犯之則藥無驗也

○脫肛證

左音工下即病也 俗作肛非

屬氣血虛與熱氣虛參芪升麻川芎血虛四物湯熱加黃
柏外以五倍子為末托而上之一次未收至五次七次必

收

○又方以陳壁土炮湯先薰後洗

○又方以驚頭燒存性為末真麻油調付即收龜頭亦可

○祖傳經驗秘方七花丸治腸風下血久痔皆効

山茶花

笑蓉花

石榴花

檢漆花

松花

白茅花

已上各一兩
燒存性

槐花

焦黑
二兩炒

枳壳

黃色
一兩麩炒

甘草

炙半兩

地榆

一錢

煨榔

二錢半

右為細末醋調麪糊為丸梧桐子大每服七八十九煎烏

梅湯下

○又方治腸風下血等証

乾柿餅

燒有性秤灰二兩

酒瓶箸

包酒過一年者或二三年者尤甚燒存性

烏梅

燒存性已上各秤

百藥煎

一兩如無以五倍子
炙焦黃代之

槐花

半兩炒焦黑

枳壳

半兩麩炒黃色

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服七八十九醋湯下

或加煑柳半兩

汗証

四十九

論

內經曰心之液爲汗原病式曰心熱則出汗東垣曰西南坤土也在人則爲脾胃夫人之汗猶天地之雨陰滋其濕則爲霧露爲雨也據內經獨主於心而東垣又指脾胃而言何也蓋心爲君火主熱脾胃屬土主濕上熱相搏爲汗明矣亦如地之濕氣爲雲霧而上升其天地若不下降則不能成霖雨也又如甑中燒酒若非湯火蒸淘則不能成汗液也夫各藏皆能令人出汗獨心與脾胃主濕熱乃摠司耳故內經又曰

飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於
腎疾走恐懼汗出於肝搖躄勞苦汗出於脾若夫自汗與盜
汗者病似而實不同也其自汗者無時而濺上然出動則爲
甚屬陽虛胃氣之所司也盜汗者寐中而通身如浴覺來方
知屬陰虛榮血之所主也大抵自汗宜補陽調衛盜汗宜補
陰降火則大法心虛冷汗自出者理宜補肝益火之原以消
陰翳也陰虛火炎者法當補腎壯水之主以制陽光也醫者
宜詳辨之毋錯

脉法

脉大而虛浮而濡者汗 在寸爲自汗在尺爲盜汗
傷寒脉陰陽俱緊當無汗若自汗者曰亡陽不治

方法

用溪方法
九四條

丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與熱盜汗屬血與陰虛

○火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之

○治自汗用人參黃芪少佐以桂枝陽虛者附子亦可用

○痰病亦有汗者

垣東

○麥煎湯治諸虛不足及新病暴虛津液虧欠體常自汗夜卧則甚久而不止體瘦心忪驚惕短氣疲倦

牡蠣

黃芪

麻黃根 各一錢

右細切作一服入小麥百餘粒水煎服

垣東

○調衛湯治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒証

黃芪

麻黃根

羌活

生甘草

當歸

稍各五分

生地黄

麥門冬

各三分

生黃耆

半夏

各五分

猪苓

二分

蘇木

紅花

各一分

五味子七粒

應忍自汗陽虛之証不應下若活半夏生要三味辛散發表之劑恐傷瀉之根姑存之

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞去粗稍熱

服

○當歸六黃湯盜汗之聖藥也

當歸一錢

生地黄

熟地黄

黃柏各七分

黃芪一錢

黃連各七分

黃芩七分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服小兒減半又

曰小兒不須治

小兒雖能自愈然不治病恐日甚治之尤妙

○黃芪建中湯治自汗及盜汗皆效方見傷寒門桂枝湯或淨加小麥一握尤妙

○四制白朮散治盜汗

白朮

四兩內一兩以黃芪同炒一兩以石解同炒一兩以杜仲同炒一兩以桑皮同炒九同炒者皆去之

右取白朮一味為末每服三錢粟米湯調下

東垣

○正氣湯盜汗

黃柏

知母各一錢半

甘草炙半錢

右細切水煎服之

東垣

○白朮散治飲酒中風多汗食即汗出如油漏久不治必成消渴

牡蠣三錢

白朮一兩二錢半

防風二兩半

右爲細末每服一錢溫水調下不計時候如惡風倍停風防白朮如多汗面腫倍牡蠣

○丹溪活套云仲景桂枝湯治外感風邪自汗之聖藥也黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗之劑也東垣補中益氣湯內治傷寒氣虛自汗之如劑也甚者六脉浮轉而虛本方加附子以治陽虛其効如鼓應桴○如左寸脉浮洪而自汗

者心火炎也本方倍參芪加麥門冬五味子黃連各半錢
○如左關脉浮弦而自汗者挾風邪也本方加桂枝芍藥
各半錢若不陰虛只有桂枝湯可用也○右關脉浮洪無
力而自汗者只因本方倍參芪而自愈○右盡脉洪數無
力而自汗者或盜汗相火挾君火之勢而尅伐肺金也本
方加黃連黃芩黃柏各半錢只用當歸六黃湯○左尺脉
浮洪無力而自汗者水虧火盛也本方加知母黃柏各半
錢熟地黃一錢壯水之主以制陽光也○凡內傷及一切
虛損之証自汗不休者總用補中益氣湯少加附子麻黃
根浮小麥其効捷如影響但升麻柴胡俱用蜜水製炒以
殺其升發勇悍之性又欲其引參芪等藥至肌表故不可
缺也○凡上所云皆指內傷虛損自汗之証故皆以補中

益氣爲主治之藥也

○上湖呂俊文得內傷虛証發熱自汗如雨不止服補中益氣湯十數貼不効予以前方加減每貼用蜜制黃芪一錢半人參一錢白朮甘草陳皮各七分當歸白芍藥各一錢升麻柴胡各一分加桂枝三分麻黃根七分浮小麥一撮炮附子三分三貼而汗止熱亦退而安

瘧病五十

論

內經曰諸瘧

滑氏曰瘧當作瘧

項強皆屬於濕

王注云太陽濕色

又曰諸暴

強直皆屬於風

王注云陽明筋而陰行於外也

原病式曰筋勁強直而不柔

和也夫肝木屬風而主筋經曰諸暴強直屬風理宜然也其所謂諸瘧項強而屬於濕者何矣蓋太陽陰濕甚則兼風化

眼開

亢則害承廼制也是故知瘧之爲病濕爲本風爲標耳故仲
景有剛柔二瘧之分不可不辨蓋剛爲陽瘧而柔爲陰瘧也
若夫太陽發惡熱無汗惡寒脉弦長脛急膏滿口噤手足攣
急咬牙甚則摘掣角弓反張此爲剛瘧太陽微熱多汗不惡
寒脉遲濇弦細四體不收時時摘掣開目合口此爲柔瘧大
抵因風濕二氣襲於太陽之經亦有輕重之分其風氣勝者
爲剛瘧風性剛急故也濕氣勝者爲柔瘧濕性柔和故也外
有諸虛之候表虛不任風寒亦能成瘧是以或產後或金瘡
或跌仆撲傷癰疽潰膿之後一切去血過多之証皆能成此
疾也是乃虛爲本而風爲標耳亦有絕無風邪而亦能使人
筋脉攣急而爲角弓反張之候者血脫無以養筋故也丹溪
甚言不可作風治而用風藥恐反燥其餘血而致不救也可

不慎與

脉法

脉經曰太陽病發熱其脉沉而細者爲瘥

瘥脉來按之築築然而弦直上下行

瘥家其脉伏堅直上下

瘥病發其汗已其脉潑潑然而蛇暴腹脹大爲欲解脉如

故反伏弦者必瘥

此瘥字恐當作死字

太陽脉其証侷身體強几几然脉沉遲此爲瘥瓜蒌桂枝

湯主之

方法

丹溪方法
凡二條

丹溪曰大率與痢相似比痢爲虛切不可作風治而純用風

藥多屬氣血虛有火有痰宜補兼降痰火參芪芩歸竹瀝

之類

○一方治少年痘瘡靨後成瘥口噤不開四肢強直時或遶臍如腹痛一陣則冷汗而雨痛定汗止脉極強緊如真孩先因勞倦傷血瘡後血愈虛而又感風寒當用溫藥養血辛涼散風芍藥當歸爲君川芎青皮鈞鉤滕爲臣白木甘草爲佐桂枝木香黃連爲使更加紅花少許水煎服愈

活人

○括萎桂枝湯治太陽傷寒成瘥

括萎根

甘草炙

各三兩

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

大棗

十二枚

右六味細切作一服以水九升煮取三升作三服連飲取微汗如汗不出少煩以熱粥湯發之

活人

○葛根湯治太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語

人活

欲作剛痊 方見傷寒門

○麻黃葛根湯治剛痊無汗惡寒

麻黃 赤芍藥 各三錢 乾葛 四錢半 豈豉 半合

右細切作一服水二大盞葱白三莖煎八分稍熱服

○大承氣湯治剛痊大便實熱 方見傷寒門

○桂枝湯根湯治柔痊有汗不惡寒 方見傷寒門

○桂枝括萎根湯治柔痊通用 方見中風門

○小續命湯治剛柔二痊通用 方見中風門

○防風當歸散治發汗過多發熱頭搖口噤背反張者宜去風

養血

防風 當歸 川芎 生地黃 各二錢

右細切作一服水煎服

金

三考
皆係
漢人

垣東

○當歸補血湯治一切去血過多因無血養筋令人四肢卒急

口禁如瘞

黃芪一兩

當歸五錢酒浸洗淨

右細切作一服水二盞剪至一盞溫服○如挾風或蕪破傷風者加防風羌活各一錢荊芥穗一錢半甘草半錢減去黃芪一半煎服

○活人舉卿舉敗散治新產血虛發瘞者汗後中風發熱亦然荊芥穗不拘多少微炒

右爲末每服三五錢外以大苴黃卷以熱酒沃之去黃卷用汁調下其効如神

○丹溪活套云昔之所謂剛柔二瘞者當以虛實論之是也一屬外感一屬內傷屬外感者爲剛瘞宜用麻黃葛根湯括

萎桂枝湯小續命湯在裏者大承氣湯之類○屬內傷者
爲柔痊宜用補中益氣湯八物湯四物湯之類如以風濕
二事分剛柔而治恐誤醫者不勝其多今以虛實分治其
理昭然無疑矣

○陶氏婦年三十餘身材小瑣形瘦弱月經數忽後日發痊口
噤手足牽縮角弓張予知其去血過多風邪乘虛而入用
四物湯加防風羌活荊芥少加附子行經二貼病減半六
貼病全安

厥証 五十一

論

內經曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥又曰
寒厥者此人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣

腹脹滿

溢下邪氣因從之而上也氣因於中由陽衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也熱厥者此人必醉飽入房精氣中虛酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主爲胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不能滲營其四肢也氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身內熱而溺赤也胃氣日衰陽氣獨盛故手足爲之熱也又陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿則下氣重上而邪氣厥厥則陽氣亂陽氣亂則令人暴仆不知人或至半日遠至一日乃知人也名曰尸厥考之張仲景傷寒論陰陽二厥之証皆指手足逆冷而言也河間原病式曰陰厥者原病脉候皆爲陰証身涼不渴脉遲而微陽厥者原病脉候皆爲陽証煩渴譫妄身熱而脉

此謂

數若陽厥極深或失下而至於身冷反見陰証脉微欲絕而死者止爲極熱而然俗醫妄謂變成陰証急用熱藥助其陽氣以致十無一生也愚按內經所寒熱二厥者皆常病虛損証也並宜補益之法但熱厥補陰寒厥當補陽耳正經所謂壯水之主以鎮陽光之益火之原以消陰翳也若夫傷寒論所謂陰二厥者冰炭殊途治法亦異診察之間死生反掌醫者其可不盡心乎

脉法

脉經曰寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入於藏則死入於府則愈此爲卒厥不知人唇清身冷爲入藏即死如身溫和汗自出爲入府而後自愈

活人書云陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏

方法

○丹溪曰厥因氣虛血虛者多氣虛脉細血虛脉大如葱管熱厥脉數外感脉浮而實有痰者脉弦熱用承氣湯痰用白朮竹瀝外感宜解散藥中加姜汁服

○活人書曰初得病身熱頭痛大便秘小便赤或畏熱或飲水或揚手擲足煩燥不得安卧譫語昏憤而厥此陽厥也大柴胡湯大小承氣湯治之渴者白虎湯妙○手足厥冷脉乍熱結此邪氣結在胃心下煩滿肌不能食瓜蒂散吐之○寒熱而厥面色不澤胃昧两手忽無脉或一手無脉必是有正汗也多用綿衣包手足急服五味湯或兼與桂枝麻黃各半湯須更大汗而解○傷寒厥逆心下怔忡者宜先治水茯苓甘草湯主之○如得病後四肢逆冷脉沉而

細足牽卧而惡寒引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥逆者陰厥也四逆湯白通湯厥逆脉不至者通脉四逆湯手足指頭微寒者謂之清理中湯無熱証而厥當歸四逆加茱萸生姜湯喘促脉伏而厥五味子湯吐利手足厥冷煩燥欲死吳茱萸湯

人活

○五味子湯治陽厥脉伏手足逆冷陰

五味子一兩人參

麥門冬

杏仁

陳皮

已上各半兩

右細切用水三盞生姜十片棗二枚煎至一盞半去粗分作二服

人活

○桂枝麻黃各半湯方見傷寒門

○茯苓甘草湯治陽厥怔忡手足厥逆心下有水氣

茯苓

桂枝 各二錢

甘草 一錢

生姜 三兩

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

入活

○通脉四逆湯治証陰厥下利清穀四肢逆冷脉微

甘草 六錢

附子 大者一

乾姜 一兩

如面赤者加葱九莖嘔者加生姜咽痛加桔梗利止脉不出加入參用水三大盞煎至一盞半去粗分作二服

入活

○當歸四逆加茱萸生薑湯治無熱証而厥

當歸

芍藥

桂枝

細辛 各一兩

甘草

通草

各六錢

茱萸 三錢

生薑 六錢

右細切水三升煮至一升半分三服

入活

○吳茱萸湯治陰厥吐利手足逆冷煩燥欲死

吳茱萸

生薑 各五錢

人參 二錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半大棗一枚服

○蘇合香丸治卒厥不知人未詳風痰氣厥先與此藥極妙每用一九以湯調化灌之即醒醒後察脉後而用他藥

○丹溪活套云熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱于脾土之中治用東垣升陽散火湯火鬱湯之類寒厥手足逆冷者多是氣血不足補氣血藥加附子飲酒人或體肥盛人手足熱者濕痰鬱火盛也二陳湯加芩連梔子之類若忽然手足逆冷卒厥不知人者多屬痰火亦有陰先虧而陽暴熱者宜多用參膏蕪竹瀝姜汁與之人瘦弱者雖無痰而火亦盛也服竹瀝亦能養血而降火

癰狂癰証

五十二

論

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲胸仆胸搖其
也是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此
則癰之類也又曰陽明之厥則顛疾欲走呼腹滿不得卧面
赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋
罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火
鬱結于中而爲之耳此則顛狂之候也曰顛曰狂分而言之
亦有異乎難經謂重陰者顛重陽者狂素問註云多喜爲顛
多怒爲狂然則喜屬爲心而怒屬於肝乃二藏相火有餘之
証難經陰陽之說恐非理也大抵狂爲痰火實盛顛爲心血
不足多爲求望高遠不得志者有之癰病獨主乎痰因火動
之所作也治去癰宜乎吐狂宜乎下顛則宜乎安神養血薰
降痰火雖然此三証者若神脫而目瞪如愚痴者縱有千金

我酬吾末如之何也已矣

脉法

脉大堅疾者顛狂 脉虛弦爲驚爲風癇

脉沉數爲痰熱

脉大滑者自己

沉小急疾者死

虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏入藏則死入府

則愈 丹溪曰顛狂脉虛易治實者難治

方法

丹溪方法
九五條

丹溪曰癇証大率屬痰與經不必分五等大法行痰爲主藥
用黃連南星瓜萎半夏尋火尋痰分多少治無不愈者有
熱者用涼藥以清心有痰者必用吐吐後用東垣安神丸
及平肝之藥青代柴胡川芎之類

○顛狂原病式所論甚精蓋以世以重陰為顛重陽為狂誤也

大槩皆是熱耳

盧氏曰重陰重陽之分難經之言也河間謂素問註云多喜為顛多怒為狂五志所

發皆為熱也心熱甚則多喜火狂制金不得平木則肝實而多怒也又發熱于中則多干陽明經謂陽明之厥則顛疾又謂脈膏梁芳草石藥則熱氣深悍發為顛狂此原病式本素問之論以明顛狂俱是熱病而重陰之說非也

○大率多因痰結於心膏間宜開痰鎮心神亦有中和者以治

和法治之

○神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如

痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

○一方治癇証用大蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內以新瓦

盛火炙令熱酥為度候冷為細末每一箇分作四服氣弱

及年幼者作五服空心白湯調下

○龍腦安神丸治男女五般顛癇無問遠近發作無時

扶神 三兩

人參

地骨皮

甘草

麥門冬

桑白皮

各二兩

馬牙硝

二錢

龍腦

麝香

各三分

牛黃

五錢

硃砂

二錢半

烏犀角

一兩

金鉞

三十五片

右為細末煉蜜為丸如彈子大金鉞為衣如風癰病冬月
溫水化下夏月涼水化下不拘時二三歲者日進二服大
人每服一九小兒一九分作二九服虛勞發熱咳嗽新汲
水化下

○神應丹治諸癰

辰砂不拘多少研細

右以猪心血和得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就丸如梧桐
子大每服一九食後臨卧煎人參湯下

○錢氏五色丸治諸癩

硃砂半兩另研

水銀二錢半

雄黃一兩熟

珍珠一兩另研末

鉛三兩用同熬

右和勻再研極細麪糊為丸如麻子大每服三四丸別煎金銀波苛湯送下

○元戎二白丸治痰涎為病患以致癩癧狂妄驚悸等証

白礬一兩

輕粉一字或半錢量虛實加減

右用生蒸餅劑累蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐子大每服二三十丸生姜湯下小兒如黍米大

○拔萃妙香丸治時毒傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚癧等

証

辰砂九兩另研

龍腦

膩粉

射香研各五錢

牛黃 五錢

金箔 九片

巴豆

二百二十五粒去皮心

右合研勻煉蜜為丸每兩分作三十丸米飲下

○子和硃砂滾涎丸治五癰等証

硃砂

白礬 生用

赤石脂

硝石 各等分

右為細末研蒜膏為丸如棗豈大每服三十丸食後荆芥

湯下

○局方碧霞丹治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癲癇狂妄等

証

石綠 半兩研 附子尖

烏頭尖

蝎梢 各二十箇

右為末入石綠令勻麪糊為丸如鷄頭實大每服一九渡

奇汗化下更以溫酒半合飲之須臾吐出痰涎然後隨証

以他藥治之如口噤者擗開灌之

控涎丹治痰迷心竅狂言謔語如有所見 方見痰飲門

○牛黃瀉心湯治心經邪熱狂言妄語心神不安

腦子另研

牛黃另研

硃砂

另研

大黃

生一兩

右各研為細末和勻再研每服三錢涼生薑密水調下

○牛黃清心丸治心氣不足神志不定驚恐顛狂語言謔妄虛

煩少睡甚至乘衣而走登高而歌踰垣上屋等証

羚羊角末

一人參

去芦二兩半

白茯苓

一兩二錢

川芎

一兩半

防風

去芦一兩半

阿膠

炒七錢

乾姜

炒七錢

白朮

一兩

牛黃

研一兩二錢

射香

研一兩

犀角末

二兩

雄黃

研飛八錢

龍腦

研一兩

金箔

一千四百片為衣

白芍藥

一兩半

柴胡

去芦一兩二錢

甘草

剉炒五兩

乾山藥

研一兩

麥門冬

去心一兩半

桔梗

去芦一兩二錢

杏仁

去皮尖及雙仁者

麵炒

黃芩

去一兩半

神麵

炒二兩

大棗

一百箇熬熟去皮核研

白欬

七錢半

蒲黃

炒二兩

大豈黃卷

一兩七錢半炒

當歸

去頭一兩半

肉桂

去皮一兩七錢半

右除棗杏仁金箔外牛黃龍腦射香雄黃四味研為細末入餘藥和勻煉密入棗膏為丸每兩作十丸金箔為衣每服一丸食後溫水化下

○丹溪活套云五志之火因七情而起鬱而成痰故為顛癇狂妄之証宜以人事制之非藥石所能療也須診察其由以平之怒傷於肝者為狂為癇以憂勝之以恐解之喜傷于心者為顛為癇以恐勝之以怒解之憂傷于肺者為癇為顛為顛以喜勝之以怒解之思傷于脾者為癇為顛為顛以思勝之以憂解之勝之以喜解之恐傷于腎者為顛為癇以思勝之以憂解之

之驚傷于膽者爲顛以憂勝之以恐解之悲傷于心胞者爲顛以恐勝之以怒解之此法惟賢者能之耳

○祖傳經驗秘方治癩癧神効

九節菖蒲一味

不拘多少不聞雞犬声者佳去毛焙乾

右以木臼杵爲細末不能犯鉄器用黑豬心以竹刀批開沙灌煮湯送下每日空心服二三錢

邪崇

五十三

論

內經曰邪氣盛則實正氣奪則虛夫經之所謂邪者風寒暑濕燥火有餘之淫邪耳非若世俗所謂鬼神之妖怪也病有心虛經惕如醉如痴如爲邪鬼所附或陽明內實以致登高而歌棄衣而走皆痰火之所爲實非妖邪崇之所迷也古雖

驚

塞

有禁呪一科及龍樹呪法之治皆移精變氣之術但可解疑
釋惑以使心神之歸正耳何邪崇之可祛哉丹溪曰血氣者
心之神也神既衰之邪因而入理或有之按此恐指少公問
若夫血氣兩虛痰虛心膏妨得升降不得運行以致十二官
各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治之其人必死可不審
乎

脉法

乍

脉乍疎乍數大乍小或促或結皆邪脉也

脉緊而急者遁死

方法

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斤邪惡鬼崇而病也如病此者未
有不因氣血先虧而致者焉

○素問遺篇曰人憂愁思慮則傷心又驚而奪汗出於心或遇精

傷

少陰司天天所不及因而三虛神明失守蓋心爲君主之官神明出焉神既失守神光不聚却遇火不及歲有黑屍鬼見之令人暴亡治去刺手少陽之所過陽池穴也復刺心榆即生○人飲食勞倦則勞脾又飲食飽甚汗出於胃醉飽入房汗出於脾或遇太陰司天天數不及因而三虛脾神不守蓋脾胃諫議之官志意出焉神既守失神光不聚却遇土不及歲有青尸鬼見之令人暴亡可刺足陽明之所過衝陽穴也復刺脾膺即生○人久坐濕地強力入水則傷腎又遇持重遠行汗出於腎或遇太陽司天天數不及因而三虛腎神不守蓋腎爲作強之官伎巧出焉神既失守神光不聚却遇水不及歲有黃屍鬼見之令人暴

亡可刺足太陽之所過京骨穴也復刺腎輸即生○人毒
怒氣逆則傷肝又遇疾走恐懼汗出於肝或遇厥陰司天
天數不及因而三虛肝神不守蓋肝為將軍之官謀慮出
焉神既失守神光不聚却遇木不及歲有白屍鬼見之令
人暴亡可刺足少陽之所過丘墟穴也復刺肝輸即生○
人形寒飲冷則傷肺復登高疾走喘出於肺或遇陽明司
天天數不及因而三虛肺神不守蓋肺為相傳之官治節
出焉神既失守神光不聚却遇金不及歲有赤尸鬼見之
令人暴亡可刺手陽明之所過合谷穴也復刺肺輸即生
凡按人見五色非常之鬼皆自己精神不守神光不定故
耳實非外邪所侮乃元氣極虛之候也因患者親目所視
故笑信真為邪鬼所迷但當推其同行同坐者不見有物
足可以決此疑耳

五邪刺法

○肝虛見白屍鬼而後暴厥不知人名曰卒屍

五和病名並同目中神

彩不變四肢雖冷心腹尚溫口中無涎舌不卷外不縮者可刺之復甦

丘墟二穴在足外踝下下如前陷中去臨泣穴五寸足少陽之原也以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼徐徐出鍼按口中閉氣腹中鳴者可治更刺肝膈

肝膈二穴在背第九椎下兩傍各一寸半以毫鍼刺三分得氣則補留三呼次進二分留三呼復取計至三分留一呼徐出鍼氣及即甦

○心虛見黑屍鬼而後暴厥不知人四肢雖冷目中精彩不變氣雖閉絕舌不卷外不縮未出一時可治刺之復甦陽池之也二穴在手表腕陷中手少陽之原也用毫鍼刺入二分

得氣則補留七呼次進一分留三呼復退留一呼徐徐出鍼手捫其穴更刺心膻

○心膻二穴在背第五椎下兩傍各一寸半用毫針刺入七分得氣則補留一呼次進一分留一呼退至二分留三呼徐徐出鍼以手捫其穴即甦

○脾虛見青晁鬼而後暴厥不知人四肢冷而身溫唇溫不出一時可治

衝陽二穴在足趺上骨間動脈去陷谷三寸足陽明之原以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼次進二分留一呼徐徐退鍼以手捫之復刺脾膻

脾膻二穴在背第十椎下兩傍各一寸半以毫鍼針刺入三分得氣則補留二呼進二分動氣至徐徐出鍼即甦

○肺虛見赤死鬼而後暴厥不知人雖無氣手足冷心腹溫鼻微溫目中神彩不變口中無涎舌不卷矧不縮者未出一時可治

合谷二穴在手大指次指兩歧骨間手陽明之原也用毫針刺入三分得氣則補留三呼復退一分留一呼徐徐出鍼以手捫其穴復刺肺腧

肺腧二穴在背第三椎下各一寸半用毫鍼刺入一寸半得其則補留三呼次進二分留一呼徐徐出鍼以手捫穴即甦

○腎虛見黃屍鬼而後暴厥不知人氣絕四肢厥冷心腹微溫目中精彩不變唇舌不黑口中無涎可救

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中足太陽之原

氣用毫鍼刺入一分半得氣則補留三呼進至三分留一呼徐徐出鍼以手捫穴復刺足少陽之膲

足少陽之膲在背第十四椎下兩傍各一寸半用毫針刺入三分得氣則補留三呼次又進五分留三呼徐徐出針以手捫其穴即甦凡以上刺法必先以口含鍼煖而刺之則經脉之氣無拒逆也

○丹溪治一婦人如癰或作或輟恍惚不省人事一日畧蘇醒診視間忽聞床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦承祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈

○秦承祖灸鬼法治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親疎

等証

以病者兩手大拇指用細麻繩扎縛定以大艾炷置於其中兩介甲及兩指角肉四處着火一處不着即無効灸七壯神驗

○還魂丹治中惡已死

麻黃 三兩 桂枝 二錢 杏仁 十二粒

右作一服水煎灌下即醒

○桃奴丸治心氣虛怯有熱晝注驚夢驚悸等証

桃奴 即桃木上不落乾者 十二月收七箇另研 辰砂 半兩 另研 桃仁 十四箇 另研

玳瑁 鎊一兩 另研 琥珀 三錢 另研 烏犀角 五錢 石水上磨

牛黃 一錢 另研 龍腦 二錢 另研 射香 一錢 另研 雄黃 桃葉煮水 三錢

安息香 一兩 以無酒研飛

右以安息香同桃仁琥珀共熬成膏和諸藥末為丸如雞

頭實大陰乾每服一九人參湯化下

○蘇合香丸治諸般怪疾

方見氣門

○一方治斃死不還用半夏末不拘多少吹入鼻中即醒

○祖傳經驗辟邪丹治衝惡怪疾及山谷間九尾狐精為患

人參

茯神

遠志

鬼箭羽

九節菖蒲

白朮

蒼朮

當歸

各一兩

桃奴

焙乾五錢

雄黃

另研

辰砂

各三錢另研

牛黃

一錢另研

金箔

二十

或加射香

一錢

右件以桃仁奴已上諸藥為細末入雄黃辰砂牛黃三味

末子和勻以酒調米粉打糊為丸如龍眼大金箔為衣臨

卧以木香湯化下一丸諸邪不敢近體更以絳紗囊盛五

七丸懸床帳中尤妙

○一婦人年二十七美貌得一証如醉如癡頰赤面青畧有潮熱飲食不美其脉乍疎乍數而虛每夜見白衣少年與睡一壘與八物湯服數十貼不効召予治之見其家有白犬卧枕戶闕予曰必此犬作怪命殺犬取其心血及膽汁丸安神定志之藥以八物湯吞下服藥十數貼丸藥一料以安其丸藥用遠志石菖蒲川歸黃連茯神硃砂側柏葉草龍胆等藥也

怔忡驚悸健忘証 五十四

論

內經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之候或因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令子虛因而心血爲之不足又或遇事繁冗思想無窮則心君亦爲之不寧故神明不安而怔忡驚悸之証作矣夫所謂怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也驚悸者驚然而跳躍驚動而有欲厭之狀有時而作者是也若夫二証之因亦有清痰積飲留結於心胞胃口而爲之者又不可固執以爲心虛而治鑿者自宜以脉証參究其的而藥之母認非以爲是也慎之慎之

脉法

寸口脉動而弱動爲驚弱爲悸

跌陽脉微而浮

此為胃氣虛微則不能食此恐懼之脉憂迫所致也

寸口脉緊跌陽脉浮胃氣則虛是以悸

肝脉動暴有所驚核

方法

凡四條

有痰

丹溪曰屬血虛有慮便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人

多是血少肥人只是痰多時覺心跳者亦是血虛怔忡無

時驚悸有時而作

○大法四物湯安神丸之類有痰者用痰藥

○驚悸者屬血虛用硃砂安神丸最好或用痰迷心竅者宜用

治痰藥

○一方治勞役大虛心跳

硃砂

白芍藥

當歸身

側柏葉

各三錢

川芎

甘草

陳皮各一錢

炒黃連一錢半

右爲細末猪心血爲丸如黍米大每服五六十丸津嚥下或少用白湯一口送下食後臨卧服

○驚悸養心湯治肥人因痰火而心惕然跳動驚起

黃芪

茯神

半夏麴

川芎各半錢

遠志

桂心

柏子仁

酸棗仁炒

五味子

人參

各二分半

甘草四分

右細切作一服生姜三片大棗一枚水一盞煎至七分服如停水加茯神換柳各三味同煎

○安神丸

黃連

一錢半酒洗

硃砂

一錢水飛

生地黃

酒洗

當歸身

酒洗

甘草

炙各半錢

人活

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十五丸食後津
唾嚥下 硃砂安神丸無地黃當歸用生甘草
○溫膽湯治心膽怯怔忡易驚

半夏

竹茹

枳殼實

各二錢

生薑

四錢

陳皮

三錢

甘草

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後溫服

方局

○定志丸治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等証

人參

白茯苓

各三兩

遠志

去心

石菖蒲

各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十丸

食後白湯下

問河

○朱雀丸治怔忡驚悸等証

茯神

二兩

沉香

半兩

硃砂

半兩

研爲衣

東垣

右爲細末燕餅丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下

○八物定志丸平補心氣安神鎮驚除肺間痰熱等証

遠志 去皮心

石菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓

各一兩

白朮

半兩

人參

一兩半

牛黃

二錢另研

煉蜜丸如梧桐子大硃砂爲衣每服二十九丸白湯送下

○歸脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神

黃芪

龍眼肉

酸棗仁

炒各一錢

人參

木香

各半錢

甘草

炙二分半

右細作一服水二盞加生薑三片大棗一枚煎至一盞去

粗溫服

○祖傳經驗秘方治憂愁思慮傷心令人惕然心跳動驚悸不

安之証

川歸酒洗

生地黃酒洗

遠志去心

茯神各五錢

石菖蒲九節

黃連各二錢半

牛黃一錢另研

辰砂二錢另研

金箔十五片

右以前六味研細入牛黃辰砂二味末子猪心血丸如黍米大金箔為末每服五十丸煎湯心湯送下

三消五十五

論

內經曰二陽結謂之消又曰痺成為消中東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液若消則自黃口乾乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤者燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治當以蘭除陳氣也不可服膏粱

食

芳草石藥其氣慄悍能助燥熱也岐伯曰脉實病久可治脉
弦小病久不可治當分三消而治之高消者舌上赤裂大渴
引飲經云心移熱於肺傳爲瞢消者是也以白虎加人參湯
治之中消者養食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲
水多飢羸痺成爲消中者是也以調胃承氣湯三黃丸治之
下消者煩渴引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水渴虧
此腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發
腦疽皆癰不能食者必傳中滿鼓脹皆爲不治之証也張潔
古分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢
氏白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣先哲用
藥厥有肯哉然臟府有遠近亦宜斟酌如心肺位近宜制小
其服腎肝位遠宜制大其服皆適其志所爲故如過與不及

皆誅罰無過之地也治斯疾者宜審焉

脉法

脉經曰取陰之爲病消渴氣上衝心中疼熱肌而不飲食則吐下之不肯止寸口脉浮而遲浮則爲虛遲則爲虛勞則衛氣不足遲則榮氣竭

趺陽脉浮而數浮則爲氣數則消穀而緊

要畧作消是矢堅

氣盛則洩數洩數則緊

要畧則堅

緊數相搏則爲消渴男子消

渴小便反多以致一斗小便一斗腎氣丸主之

心脉滑爲渴滑者陽氣勝

心脉微小爲消痺消痺脉實大病

久可治懸小堅急病久不可治

脉數大者生沉小者生實而堅大者死細而浮短者死結硬

方法

冊溪方法
九五條

丹溪曰養肺降火生血爲主分上中下治

上焦者肺也多飲水而少食小便如常

中中消者渭也多飲食而小便赤黃

下消者腎也小便濁淋如膏之狀

○大法黃連天花粉二味爲末藕汁人乳汁生地黃汁佐以蜜
姜汁爲膏和二末留舌上徐徐以白湯少許送下能食者
加石膏

○猪肚丸

黃連

五兩

麥門冬

知母

括萎根

各四兩

之蒸右爲細末入雄猪肚內縫熟棄熱於石臼中搗爛如乾加
煉蜜丸如梧桐子大每服一有丸食後米飲下可以清心
止渴

○天花粉治消渴之聖藥也 凡消渴藥中大禁半夏及不可

發汗

○三消者瓊玉膏最妙 方見咳嗽門

○和血益氣湯治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

麻黃根

各三分

當歸

稍酒洗四分

知母

酒洗

漢防己

酒洗

羌活

各半錢

石膏

六分

生地黄

酒洗

黃連

酒洗八分

黃柏

酒洗

升麻

各一分

杏仁

去皮另研六分

紅花

少許

桃仁

去皮另研六分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服忌酒醋熱濕麪

○當歸酒燉湯治小便多大便秘澀乾燥枯梗燥渴喜好溫飲

陰頭暈縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛分

生甘草

炙甘草

熟地黄各三分

柴胡

去芦 七分

黃柏

酒洗

知母

酒洗

石膏

桃仁泥

當歸身

麻仁

防風

荊芥穗

各一錢

升麻

一錢半

紅花

少許

杏仁

七箇另研為泥

小椒

三粒

右細切作一服水二盞煎至一盞熱服食遠忌辛熱物

○生津甘露湯

一名清涼子飲

治消中能食而瘦口舌乾自汗

大便結燥小便頻數

升麻

四分

防風

去芦

生甘草

漢防已

生地黄

各三分

當歸身

六分

柴胡

羌活

炙甘草

黃芪

酒知母

酒黃苓

各一錢

酒草龍胆

石膏

黃柏

各一錢半

紅花

少許

桃仁五箇 另研 杏仁十箇 研

右細作一服水二盞煎至一盞加酒一匙稍熱服

○辛潤緩肌湯一各清神 補氣湯 前消渴証纔愈止有口乾腹不能努

此藥主之

生地黃 細辛各一分 熟地黃 石膏四分

黃栢甬洗 黃連 生甘草 知母各半錢

柴胡去芦 當歸身 荆芥穗各一錢 升麻半錢

桃仁泥 防風各一錢 紅花少許 杏仁六箇 另研

小椒一

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱服食素

○生津甘露飲子治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或泄黃如糜名曰飧泄渾身色黃目睛黃甚

四肢痿弱前陰如水尻臂腰背寒面生蠶色脇下急痛善噦喜怒不常健忘

霍香 二分

柴胡

黃連

木香 各三分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香 各五分

澤澄茹

生甘草

山梔子

白豆仁

白芷

連翹

姜黃 各一

石膏 二分

杏仁 去皮

酒黃柏 各一

炙甘草

酒知母

升麻

人參 各二錢

桔梗 三錢

全蝎 五箇

右爲細末湯浸蒸餅和勻成劑捏作片子日中晒半乾擦

碎如黍米多大每服一錢津嚥下或白湯送下遠服

○黃芪飲治三消

黃芪 六兩

炙甘草 兩

每服二錢水煎服

垣東

六味地黃丸

方見虛損門

人參白朮湯治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成爲消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲水而小便數煎療一切陰虛陽實風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒腸胃燥澁併傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

茯苓

連翹

括萎根

乾葛

甘草

蘆香葉

青木香

官桂

石膏

寒水石

白滑

右爲細末每服抄五錢水一盞入盆砂半兩生薑三片煎

垣東

至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臍府流利
取効如常服以意加減如腸胃鬱結溫熱肉甚自利者去
大黃芒硝服

○絳雪散治消渴飲水無度小便數者大有効
黃芩 黃丹 漢防己 括萎實各等分

右為細末每服二錢溫漿水調下臨卧時併進三服即止

垣東

○人參散治腎消善飲而食小便頻數白濁如膏

人參一分 白朮 澤瀉 括萎根

桔梗 梔子 連翹各二分 葛根

黃芩 大黃 波奇 白茯苓各五分

甘草七分 石膏一錢 滑石 寒水石各一錢半

縮砂

問河

右細切作一服爲末水一盞半煎至一盞入蜜少許再煎三兩沸腎消食前上消食後服

○大黃甘草飲子治男子婦人一切消渴不能止者

大豆

五升先煮二三沸出淘去苦水再煮

大黃半兩

甘草

四兩長四指段挺碎

右用井水一桶將前藥同煮三五時如稠強更添水煮豆軟煮爲度盛於盆中放冷令病人食豈渴飲湯汁無時候食盡如燥渴止罷藥未止依前再煮食之不過三劑其病悉愈

問河

○麥門冬飲子治心移熱於肺名曰膈消心膈有熱久則引飲爲消渴

麥門冬

去心

括萎根

知母

甘草

五味子

生地黃

人參

葛根

扶神 各半錢

右細切作一服加竹葉七片用水一盞煎至七分溫服

○丹溪活套云三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯爲主
治上消者本方加人參五味子麥門冬天花粉煎入生藕
汁生地黃汁人乳飲酒人加生薑汁○中消者本方加知
母石膏滑石寒水石以降胃火○下消者本方加黃柏知
母熟地黃五味子之類以滋腎水又間當飲繅綠湯爲上
策

○經驗原蚕蠶湯治腎消白濁及上中二消飢渴不生肌肉其
効如神蓋此物屬火有陰之用大能瀉膀胱中祖火引陰
水上潮于口而不渴也

原蚕

却再養晚蚕也其繅綠湯極効如無繅
綠湯以蠶殼煎湯皆可代之

刻明

醫

學正傳

卷之五

終

醫學正傳卷之五

終